

- infekcije uzrokovane netuberkuloznim (atipičnim) mikobakterijama
 - prethodne BCG vakcinacije (osobe vakcinisane BCG vakcinom, normalno postaju tuberkulin pozitivne nakon 4-6 nedelja)
- Kod sledećih grupa pacijenata pozitivne vrednosti Mantoux-ove probe bliže su donjoj granici (kreću se u opsegu od 6 do 9 mm):
- pacijenti sa HIV infekcijom ili faktorima rizika za ovo oboljenje kod kojih infekcija još nije utvrđena
 - osobe koje su nedavno bile u bliskom kontaktu sa obolelima od aktivne tuberkuloze
 - pacijenti koji imaju fibrotičke promene na plućima (na osnovu rentgenskog snimka grudnog koša), kao posledicu zaležene tuberkuloze

Režim izdavanja/Mesto primene

PPD-T tuberkulin se može upotrebljavati u zdravstvenim ustanovama, pod kontrolom iskusnog lekara.

Kontraindikacije

Kontraindikacija za sprovođenje tuberkulinske probe je preosetljivost pacijenta na bilo koju komponentu ovog proizvoda.

Takođe, tuberkulinska proba se ne sme primeniti kod pacijenata koji su prethodno ispoljili težu kožnu reakciju na ovaj proizvod.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi lekova

Odgovarajući medicinski tretman mora biti uvek na raspolažanju kako bi se odmah reagovalo na potencijalni anafilaktički šok, bez obzira što se nakon tuberkulinske probe anafilaktička reakcija retko ispoljava (<1/1000).

Kod pacijenata koji imaju ili se sumnja da imaju aktivnu tuberkulozu, tuberkulinsku probu treba primeniti oprezno. Kod osoba sa aktivnom tuberkulozom mogu se ispoljiti ozbiljnije i teže lokalne reakcije, dok kod pacijenata sa teškim oblikom tuberkuloze (npr. milijarna tuberkuloza) reaktivnost na tuberkulin može biti suprimirana, a rezultat proba negativan.

Reaktivnost na tuberkulin može biti smanjena i stoga dovesti do lažno-negativnih nalaza kod određenih oboljenja i stanja ili usled primene određenih lekova (videti odeljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija).

Ponavljanje kožne probe tokom perioda kraćeg od godinu dana treba izbegavati, da negativna reakcija ne bi prešla u pozitivnu.

Prema preporuci Svetske Zdravstvene Organizacije, primena kožnih proba i ponovljena vakcinacija protiv tuberkuloze više se ne preporučuju. Prema nacionalnom programu imunizacije, vakcinacija protiv tuberkuloze sprovodi se kod dece odmah po rođenju, odnosno prilikom otpuštanja iz porodišta ili najkasnije do drugog meseca života. Ukoliko u ovom periodu nije izvršena vakcinacija, ona se mora izvršiti do navršene prve godine života deteta.

PPD-T tuberkulin je namenjen isključivo za intradermalnu primenu.

Ne sme se primeniti intravenski, intramuskularno ili supkutano!

Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

Reaktivnost na tuberkulin može biti smanjena (i stoga dovesti do lažno-negativnih nalaza) u slučaju:

- teške bakterijske infekcije i virusne infekcije (HIV infekcija, infektivna mononukleозa, male boginje, varičela i grip);
- neoplastičnog oboljenja (naročito limfoma) ili tretmana UV zračenjem;
- sarkidoze;
- hronične bubrežne insuficijencije;
- dehidratacije i malnutricije;
- imunosupresije zbog bolesti, hirurških intervencija ili primene lekova (imunosupresivnom dozom kortikosteroida smatra se primena 15 mg ili više predniza dnevno, tokom najmanje mesec dana);
- nedavne vakcinacije živim virusnim vakcinama, kao što su OPV vakcina, MMR vakcina, vakcina protiv varicele ili žute groznice (tuberkulinsku kožnu probu treba odložiti sve dok ne prođe 4-6 nedelja od primene žive vakcine ili istog dana sprovesti i probu i vakcinaciju, a rezultate probe očitati u roku od 48-72 sata).

Plodnost, trudnoća i dojenje

Reprodukтивne studije na životinjama nisu sprovedene i do sada nisu zabeleženi teratogeni efekti prilikom primene tuberkulinske kožne probe kod trudnice.

Međutim, kontakt majke koja boluje od aktivne tuberkuloze i novorođenčeta neposredno posle porođaja nosi visok rizik od razvoja tuberkuloze kod novorođenčeta, sa ozbiljnim komplikacijama kao što je tuberkulozni meningit. Stoga, ukoliko lekar sumnja da trudnica boluje od aktivne tuberkuloze, treba dobro da proceni da li koristi od primene ove probe prevazilaze moguće rizike i sproveđe probu u drugom ili trećem trimestru trudnoće, ukoliko je potrebno.

Uticaj leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama Podaci nisu dostupni.

Neželjena dejstva

Lek PPD-T tuberkulin, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

Neželjena dejstva koja se mogu ispoljiti pri tuberkulinskoj probi, prikazana su prema sledećoj učestalosti:

veoma česta ≥1/10

česta	≥1/100	<1/10
povremena	≥1/1000	<1/100
retka	≥1/10000	<1/1000
veoma retka	<1/10000	
		pojedinačni slučajevi

Procena učestalosti neželjenih dejstava, zasniva se na podacima Svetske zdravstvene organizacije.

česta (≥1/100 do <1/10)	lokalna: bol, iritacija ili nelagodnost na mestu uboda, neposredno nakon primene
povremena (≥1/1000 do <1/100)	sistemski: glavobolja, mučnina, vrtoglavica, malaksalost, pireksija, groznica
retka (≥1/10000 do <1/1000)	lokalna: uvećanje regionalnih limfnih čvorova
veoma retka (<1/10000)	sistemski: anafilaksija (anafilaktička ili anafilaktoidna reakcija) lokalna: granulom, preosetljivost na tuberkulin može uzrokovati pojавu vezikula, ulceracija i nekrozu kože

Mada je anafilaktička reakcija retka, nakon давanja PPD-T tuberkulina treba uvek imati na raspolažanju i odgovarajući medicinski tretman, kako bi se odmah reagovalo na potencijalni anafilaktički šok.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd, Republika Srbija
fax: +381 (0)11 39 51 131
website: www.alims.gov.rs
e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

Predoziranje

Povećanjem doze, smanjuje se specifičnost probe i povećava rizik od neželjenih reakcija.

Lista pomoćnih supstanci

Hinozol
Polisorbat 80
Dinatrijum-hidrogenfosfat, dihidrat
Kalijum-dihidrogenfosfat
Natrijum-hlorid
Voda za injekcije

Inkompatibilnost

Preparat ne sme da se meša sa drugim lekovima, serumima i vakcinama u istom špricu.

Rok upotrebe

Rok upotrebe neotvorenog leka: 6 meseci.

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja boćice: preparat iskoristiti u roku od 8 sati pod uslovom da se čuva u frižideru na temperaturi od 2°C do 8°C. Lek ne upotrebljavati posle isteka datuma označenog na spoljnjem pakovanju.

Posebne mere upozorenja pri čuvanju

Lek PPD-T tuberkulin čuvati u originalnom pakovanju, u frižideru, na temperaturi od 2°C do 8°C.

Ne zamrzavati.

Za uslove čuvanja nakon prvog otvaranja leka, videti odeljak "Rok upotrebe"

Priroda i sadržaj pakovanja

Unutrašnje pakovanje: staklena boćica od bezbojnog stakla, zapremine 3 mL (staklo tip I), zatvorena sivim gumenim zapušaćem i aluminijumskom kapicom.

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 10 staklenih boćica (10 x 2.5 mL) i Uputstvo za lek.

Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)

Prazne boćice od prečišćenog proteinskog derivata tuberkulina sa humanu upotrebu, boćice koje nisu ispraznjene, ali nisu za dalju upotrebu, upotrebljene špriceve, igle i materijal za dezinfekciju treba odložiti bezbedno u posebnim polietilenским kesicama i namenskim čvrstim kontejnerima uništiti u skladu sa važećim propisima. Svi neiskorišćeni količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti u skladu sa važećim propisima.



Institut za
virologiju,
vakcinu i
serume

UPUTSTVO ZA LEK

PPD-T® tuberkulin

rastvor za injekciju, 3 i.j./0.1 mL

Prečišćeni proteinski derivat tuberkulina za humanu upotrebu

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja, обратите se svom lekaru ili farmacevту ili medicinskom sestrin.
- Ovaj lek propisan je samo Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, kada i kada imaju iste znače bolesti kao i Vi.
- Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, обратите se Vašem lekaru ili farmacevtu ili medicinskoj sestrin. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

U ovom uputstvu pročitajte:

1. Šta je lek PPD-T tuberkulin i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što primite lek PPD-T tuberkulin
3. Kako se primenjuje lek PPD-T tuberkulin
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek PPD-T tuberkulin
6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek PPD-T tuberkulin i čemu je namenjen

PPD-T tuberkulin je rastvor dobijen prečišćavanjem filtrata tečne kulture *Mycobacterium tuberculosis*, koji se primenjuje intradermalno (Mantoux-ova proba). Pripada farmakoterapijskoj grupi dijagnostičkih sredstava. Intradermalno primjenjen PPD-T tuberkulin izaziva kasnu reakciju preosetljivosti kod osoba koje su prethodno bile senzitivisane *Mycobacterium* infekcijom. Nakon infekcije mikobakterijama, senzitizacija T ćelija se odvija primarno u regionalnim limfnim čvorovima, čime se aktivira celularni imunski odgovor. Dolazi do proliferacije specifičnih T ćelija kao odgovor na infekciju u ovi T limfociti nakon nekoliko nedelja ulaze u sistemsku cirkulaciju, gde ostaju tokom dugog vremenskog perioda. Ponovna stimulacija T limfocita intradermalno primenjenim PPD tuberkulinom izaziva lokalnu reakciju posredovanu ovim ćelijama.

PPD-T tuberkulin se koristi kao dijagnostički antigen za određivanje preosetljivosti na tuberkulin kod osoba koje nisu vakcinisane BCG vakcinom, kada se razmatra potreba za vakcinacijom. Primjenjuje se i kao pomoćno dijagnostičko sredstvo u utvrđivanju infekcije *Mycobacterium tuberculosis* kod odraslih osoba kod kojih postoji sumnja na ovu infekciju (uključujući i HIV pozitivne pacijente), kao i kod dece sa visokim rizikom za pojavu ovog oboljenja.

2. Šta treba da znate pre nego što primite lek PPD-T tuberkulin

Lek PPD-T tuberkulin ne smete primati:

- Ako ste Vi ili Vaše dete preosetljivi na aktivnu supstancu ili na bilo koju drugu komponentu ovog proizvoda.
- Ukoliko ste Vi ili Vaše dete prethodno ispoljili težu kožnu reakciju na ovaj proizvod.

Upozorenja i mere opreza:

Kod pacijenata koji imaju ili se sumnja da imaju aktivnu tuberkulozu, tuberkulinsku probu treba primeniti oprezno. Kod osoba sa aktivnom tuberkulozom mogu se ispoljiti ozbiljnije i teže lokalne reakcije, dok kod pacijenata sa teškim oblikom tuberkuloze (npr. milijarna tuberkuloza) reaktivnost na tuberkulin može biti suprimirana, a rezultat proba negativan.

Reaktivnost na tuberkulin može biti smanjena (i stoga dovesti do lažno-negativnih nalaza) u slučaju:

- teške bakterijske infekcije i virusne infekcije (HIV infekcija, infektivna mononukleозa, male boginje, varičela i grip);
- neoplastičnog oboljenja (naročito limfoma (maligno oboljenje limfocita, vrste belih krvnih ćelija)) ili tretmana UV zračenjem;
- sarkidoze (vrsta zapaljenske reakcije u kojoj limfociti, vrsta ćelija krvi, prekomerno reaguju pa dolazi do njihovog nakupljanja u zahvacenim organima što za posledicu ima nestanak normalne građe tkiva tog organa);
- hronične bubrežne insuficijencije (slabosti);
- dehidratacije (gubitak tečnosti i elektrolita u organizmu) i malnutricije (nedostatak hranljivih materijala u organizmu 'potrhanjenost');
- imunosupresije (smanjena aktivnost imunog (odbrambenog sistema)) zbog bolesti, hirurških intervencija ili primene lekova (imunosupresivnom dozom kortikosteroida smatra se primena 15 mg



Vojvode Stepe 458
Beograd, Srbija

tel: 011/395 37 00
fax: 011/246 96 54
office@tortlak.rs

ili više prednizona dnevno, tokom najmanje mesec dana);
- nedavne vakcinacije živim virusnim vakcina, kao što su OPV vakcina (vakcina protiv dečje paralize), MMR vakcina (vakcina protiv malih boginja, zaušaka i ruboile), vakcina protiv varicele (ovčijih boginja) ili žute groznice (zarazna bolest koju izaziva virus) (tuberkulinsku kožnu probu treba odložiti sve dok ne prođe 4-6 nedelja od primene žive vakcine ili istog dana sprovesti i probu i vakcinaciju, a rezultate probe očitati u roku od 48-72 sata).

- U slučaju poznate preosetljivosti (alergije) na bilo koju komponentu PPD-T tuberkulina, uključujući i pomoćne materije (hinozol, Tween 80) tuberkulinska proba se ne sme primeniti.

Prema preporuci Svetske Zdravstvene Organizacije, primena kožnih proba i ponovljena vakcinacija protiv tuberkuloze više se ne preporučuje. Prema nacionalnom programu imunizacije, vakcinacija protiv tuberkuloze sprovodi se kod dece odmah po rođenju, odnosno prilikom otpuštanja iz porodilišta ili najkasnije do drugog meseca života. Ukoliko u ovom periodu nije izvršena vakcinacija, ona se mora izvršiti do navršene prve godine života deteta.

PPD-T tuberkulin je namenjen isključivo za intradermalnu primenu.

Ne sme se primeniti intravenski, intramuskularno ili suputano!

Drugi lekovi i PPD-T tuberkulin

Ukoliko ste Vi ili Vaše dete nedavno vakcinisani živim virusnim vakcina, kao što su OPV vakcina (vakcina protiv dečje paralize), MMR vakcina (vakcina protiv malih boginja, zaušaka i ruboile), vakcina protiv varicele (ovčijih boginja) ili žute groznice (zarazna bolest koju izaziva virus), tuberkulinski kožni probi treba odložiti sve dok ne prođe 4-6 nedelja od primene žive vakcine ili istog dana sprovesti i probu i vakcinaciju, a rezultate probe očitati u roku od 48-72 sata.

Preparat ne sme da se meša sa drugim lekovima, serumima i vakcinaima u istom špricu.

Trudnoća i dojenje

Reprodukтивne studije na životinjama nisu sprovedene i do sada nisu zabeleženi teratogeni efekti prilikom primene tuberkulinske kožne probe kod trudnica.

Međutim, kontakt majke koja boluje od aktivne tuberkuloze i novorođenčeta neposredno posle porođaja nosi visok rizik od razvoja tuberkuloze kod novorođenčeta, sa ozbiljnim komplikacijama kao što je tuberkulozni meningitis (hronično oboljenje moždanih opni i moždanog tkiva izazvano Kochovim bacilom). Stoga, ukoliko lekar sumnja da trudnica boluje od aktivne tuberkuloze treba dobro da proceni da li koristi od primene ove probe prevazilaže moguće rizike i sproveđe probu u drugom ili trećem trimestru trudnoće, ukoliko je potrebno.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Podaci nisu dostupni.

3. Kako se primenjuje lek PPD-T tuberkulin

Doziranje:

Jedna doza tuberkulina sadržana je u 0.1 mL preparata.

Način primene:

PPD-T tuberkulin (Mantoux-ova proba) se primenjuje intradermalnim ubrizgavanjem jedne doze (0.1 mL) preparata u predeo prednje strane leve podlaktice (na spoju gornje i srednje trećine) i to u pravcu duže ose. Tuberkulin se može adsorbovati na površinu šprica, pa zato injekciju treba primeniti bez odlaganja.

Za ubrizgavanje se koriste tuberkulinski špricevi sa odgovarajućim intradermalnim iglama za jednokratnu upotrebu, za svakog pacijenta posebno.

Rezultat se očitava 48 do 72 časa nakon injekcije, merenjem induracije poprečno u odnosu na dužu osu podlaktice. Očitavanje rezultata Mantoux-ove probe detaljno je opisano na kraju uputstva za lek u delu "Sledeće informacije namenjene su isključivo zdravstvenim stručnjacima".

Ako ste primili više leka PPD-T tuberkulin nego što treba

Povećanjem doze, smanjuje se specifičnost probe i povećava rizik od neželjnih reakcija. Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka obratite se svom lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se javе kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Neželjena dejstva se prema učestalosti klasifikuju na sledeći način:
Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se javе kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

Cesta neželjena dejstva (mogu da se javе kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

Povremena neželjena dejstva (mogu da se javе kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

Retka neželjena dejstva (mogu da se javе kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se javе kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):

Nepoznata učestalost: ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka.

Procena učestalosti neželjenih dejstava, zasniva se na podacima Svetske zdravstvene organizacije.

česta (≥1/100 do <1/10)	lokalna: bol, iritacija ili nelagodnost na mestu uboda, neposredno nakon primene
povremena (≥1/1000 do <1/100)	sistemski: glavobolja, mučnina, vrtloglavica, malaksalost, pireksija (napadi groznice), groznicasti
retka (≥1/10000 do <1/1000)	lokalna: uvećanje regionalnih limfnih čvorova sistemski: anafilaksika (anafilaktička ili anafilaktoidna reakcija) (teška alergijska reakcija celog tela)
veoma retka (<1/10000)	lokalna: granulom, preosetljivost na tuberkulin može uzrokovati pojавu vezikula (promene na koži u obliku kesica), ulceracija ("potkožni čir") i nekrozu kože (promene na koži u vidu opekokina) veoma retka (<1/10000)

Mada je anafilaktička reakcija retka, nakon davanja PPD-T tuberkulina treba uvek imati na raspolaganju i odgovarajući medicinski tretman, kako bi se odmah reagovalo na potencijalni anafilaktički šok (teška alergijska reakcija).

Povećanjem doze smanjuje se specifičnost probe i povećava rizik od neželjnih reakcija.

Ukoliko bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno, ili ukoliko primetite bilo koja neželjena dejstva koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo obavestite svog lekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta ili medicinsku sestruru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilanciju
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. Kako čuvati lek PPD-T tuberkulin

Čuvati lek van vidokruga i domaćašja dece!

Ne sme se upotrebljavati lek PPD-T tuberkulin posle isteka roka upotrebe označenog na spoljnjem pakovanju ("Važi do"). Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Lek treba čuvati u originalnom pakovanju, u frižideru na temperaturi od 2°C do 8°C.

Nakon prvog otvaranja boćice, preparat treba iskoristiti u roku od 8 sati, pod uslovom da se čuva u frižideru na temperaturi od 2°C do 8°C.

Ne zamrzavati.

Neupotrebљivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebљivi lekovi od građana. Neupotrebљivi lekovi se ne smiju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek PPD-T tuberkulin

Aktivna supstanca je prečišćeni proteinski derivat tuberkulina za humanu upotrebu.

Jedna doza (0.1 mL rastvora) sadrži 3 i.j. prečišćenog proteinskog derivata tuberkulina za humanu upotrebu.

Pomoćne supstance:

Hinozol
Polisorbat 80
Dinatrijum-hidrogenfosfat, dihidrat
Kalijum-dihidrogenfosfat
Natrijum-hlorid
Voda za injekcije

Kako izgleda lek PPD-T tuberkulin i sadržaj pakovanja

PPD-T tuberkulin je bezbojan do slabo žuto obojen rastvor, bez mirisa ili

blago karakterističnog mirisa.

Unutrašnje pakovanje: staklena bočica od bezbojnog stakla, zapremine 3 mL (staklo tip I), zatvorena sivim gumenim zapušaćem i aluminijskom kapicom.

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 10 staklenih bočica (10 x 2.5 mL) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvodnja

INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME TORLAK
Vojvode Stepe 458, Beograd, Republika Srbija
tel: (011) 395 37 00; fax: (011) 246 96 54
e-mail: office@torlak.rs

Ovo uputstvo je poslednji put odobren:

Januar, 2020.

Režim izdavanja leka:

Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi.

Broj i datum dozvole:

515-01-03299-19-001 od 14.01.2020.

Za ovaj lek je izdata uslovna dozvola za lek na period od 12 meseci

SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA:

Terapijske indikacije

PPD-T tuberkulin (intradermalna Mantoux-ova proba) se koristi kao dijagnostički antigen za određivanje preosetljivosti na tuberkulin kod osoba koje nisu vakcinisane BCG vakcinom, kada se razmatra potreba za vakcinacijom.

PPD-T tuberkulin (intradermalna Mantoux-ova proba) se primenjuje i kao pomoćno dijagnostičko sredstvo u utvrđivanju infekcije *Mycobacterium tuberculosis* kod odraslih osoba kod kojih postoji sumnja na ovu infekciju (uključujući i HIV pozitivne pacijente), kao i kod dece sa visokim rizikom za pojavu ovog oboljenja.

Doziranje i način primene

PPD-T tuberkulin je pripremljen kao rastvor za intradermalnu Mantoux-ovu probu, koji je standardizovan u odnosu na internacionalni standard za PPD *mammalian*, tako da 0.1 mL rastvora sadrži 3 i.j. prečišćenog proteinskog derivata tuberkulina. Jedna doza tuberkulina sadržana je u 0.1 mL ovog preparata.

Mantoux-ova proba izvodi se intradermalnim ubrizgavanjem jedne doze (0.1 mL) preparata u predeo prednje strane leve podlaktice (na spoju gornje i srednje trećine) i to u pravcu duže ose.

Za ubrizgavanje koristiti tuberkulinski špricevi sa odgovarajućim intradermalnim iglama za jednokratnu upotrebu, za svakog pacijenta posebno.

Tuberkulin se može adsorbovati na površinu šprica, pa zato injekciju treba primeniti bez odlaganja.

Nakon dezinfekcije treba sačekati da se mesto primene osuši. Potom se koža blago zategne i vrh igle ubaci u površinski sloj dermisa (igla je gotovo paralelna sa površinom kože i otorom je okrenuta navise). Igla treba da bude vidljiva kroz epidermis tokom injekciranja. Rastvor se polako ubrizgava. Pravilno ubrizgavanje dovodi do pojave papule promera 8-10 mm koja se održava oko 10 minuta. U slučaju da se papula ne pojavi, probu odmah ponoviti na drugom mestu. Injekcija može rezultirati induracijom koja je okružena crvenilom, nekoliko sati nakon ubrizgavanja.

Rezultat se očitava 48 do 72 časa nakon injekcije, merenjem induracije poprečno u odnosu na dužu osu podlaktice. Na mesto primene tuberkulinske probe, palpatorno se odredje granice induracije, a zatim se providnim i savitljivim lenjirom izmeri dijametar induracije u milimetrima.

OCITAVANJE REZULTATA MANTOUX-OVE PROBE (dijametar induracije)		
negativan 0-5 mm	pozitivan 6-14 mm	jako pozitivan ≥15 mm

Negativnom tuberkulinskom reakcijom smatra se pojava induracije u prečniku manjem od 5 mm ili odsustvo bilo kakve promene na mesto primene injekcije.

Osobe kod kojih je reakcija negativna, a koje nisu vakcinisane BCG vakcinom, treba da se vakcinisu.

Pozitivnom tuberkulinskom reakcijom smatra se pojava induracije prečnika najmanje 6 mm, sa ili bez pratećeg crvenila na mesto ubrizgavanja. Samo se induracija uzima u obzir. Beleži se i ukoliko je prisutna nekroza, edem ili eritem, ali se ovi podaci ne koriste u interpretaciji rezultata tuberkulinske probe.

Pozitivna tuberkulinska reakcija ukazuje na odgovor imunog sistema koji može biti posledica:

- infekcije uzrokovane kompleksom mikobakterija koje mogu uzrokovati tuberkulozu (*M. tuberculosis*, *M. bovis*, *M. africanum*, *M. microti* ili *M. canetti*)